

Uso del inhalador con espaciador

(aero-cámara/ "chamber")




1

Verifique la fecha de expiración del medicamento. Agite el medicamento antes de usarlo. Se recomienda hacerlo cada vez que vaya a utilizarlo.



2

Retire el protector de la boquilla del inhalador. Puede hacer una atomización de prueba, si el medicamento no se ha utilizado por un tiempo prolongado o es la primera vez que va a utilizarlo.



3

Coloque la boquilla del inhalador en la abertura, ubicada en la pieza trasera del espaciador.



4

Luego de hacer dos ejercicios de respiración inhalado por la nariz y exhalando por la boca, introduzca la boquilla del espaciador en su boca o la boca de la persona con asma. Procure hacer un buen sellado evitando cualquier escape. Coloque la lengua de forma que no le obstruya la boquilla del espaciador.



5

Oprima para descargar el medicamento e inhale. Contenga la respiración contando hasta 10, procurando que el medicamento no se escape por la nariz. Si tiene mascarilla, puede respirar como lo hace regularmente.



6

Con mascarilla: espere 10 segundos inhalando y exhalando como lo hace regularmente y luego retire el espaciador.

Sin mascarilla: Luego de hacer la inhalación, retire el espaciador y contenga la respiración por 10 segundos, manteniendo la boca cerrada. Luego exhale suavemente.

*De tener que hacer otra inhalación, espere 1 minuto y repita el proceso, incluyendo los ejercicios de respiración.