

Voici nos résultats d'oeil de longe. Comme je disais précédemment, notre programme alimentaire a été perfectionné avec les années, et notre conseiller M. Alain Doucet nous a donné un suivi très serré, des visites à la ferme très fréquentes pour évaluer les taureaux. Nous avons obtenu le résultat demandé: des taureaux qui suivi le gain demandé, qui sont bien développés et prêts pour la saillie, mais non sur-alimentés, ce qui réduit la qualité des pieds et membres. Mais surtout: ils ont une faible accumulation de gras, car une accumulation excessive de gras peut avoir une influence sur la fertilité des taureaux.

Angus			
		Gras dorsal Rib fat (mm)	Œil de longe (cm <sup>2</sup> )ajusté / ribarea adj.
LOUB	397E	7,4	80,3
LOUB	403E	5,1	82,4
LOUB	423E	6,4	88,4
LOUB	436E	7,4	93,2
LOUB	439E	6,4	91,9
LOUB	465E	4,6	82,1
LOUB	479F	4,6	81,1
LOUB	494F	4,6	75,4
LOUB	495F	6,9	83,8
LOUB	500F	3,6	62,0
LOUB	502F	5,8	77,8
LOUB	506F	5,6	79,3
LOUB	508F	3,6	77,3
LOUB	514F	7,4	83,0
LOUB	516F	6,4	70,1
LOUB	517F	5,1	88,1
LOUB	521F	7,9	78,7

Charolais			
		Gras dorsal Rib fat (mm)	Œil de longe (cm <sup>2</sup> )ajusté / ribarea adj.
LOUB	392E	5,6	100,1
LOUB	396E	4,6	77,6
LOUB	398E	5,6	81,6
LOUB	402E	3,6	80,4
LOUB	415E	5,6	94,0
LOUB	417E	5,6	91,4
LOUB	421E	3,6	88,3
LOUB	430E	5,8	101,4
LOUB	432E	5,1	88,5
LOUB	441E	3,6	76,5
LOUB	442E	4,1	92,6
LOUB	444E	5,6	84,3
LOUB	445E	5,1	94,6
LOUB	451E	4,1	81,8
LOUB	452E	4,1	77,6
LOUB	456E	2,8	82,3
LOUB	462E	5,1	76,0
LOUB	464E	5,1	86,0
LOUB	468F	Résultats à l'association, à venir cette semaine	
LOUB	469F	4,6	101,5
LOUB	477F	5,6	81,6
LOUB	481F	4,6	89,5
LOUB	488F	4,1	87,0
LOUB	504F	3,6	87,4
LOUB	520F	4,1	74,1
LOUB	522F	4,1	99,5
LOUB	550F	3,6	89,8
LOUB	559F	3,3	96,5