

Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy

American Board of Internal Medicine

Diplomate in Gastroenterology & Internal Medicine

David Cohen, M.D.

Arin H. Newman, M.D.

Daniel Wolfson, M.D.

Preparacion para una Colonoscopia con OsmoPrep

Comprar en la farmacia: OsmoPrep (por receta)

Una semana antes: No tome pastillas que contengan hierro o medicinas que puedan causar sangramiento. Esto incluye Aspirinas, Ecotrin, Alka-Seltzer,. Pare cualquier medicina anti-inflamatoria como: Empirin, Bufferin, Ascriptin, Iboprofen, Motrin, Advil, Medipren, Nuprin, Naproxen (Naproxyn), Sulindac, Clinoril, Piroxican, Feldene, Aleve, Indomethacin, Indocin, Diclofenac, Voltaren, Celebrex. Si puede tomar Tylenol y otras medicinas que contengan Acetaminophen.

El dia antes del procedimiento:

1. Tomar liquidos claros todo el dia desde el desayuno. Liquidos claros incluyen: Consome, sodas, te, café sin leche ni crema, sodas, jugos de manzana, y uva o cualquier jugo que usted pueda ver a traves y que no tengan pulpa, helados con base de agua. Puede comer gelatina **que no sea roja**.
2. Las pastillas deben ser tomadas con 64oz. de cualquier liquido claro de su preferencia. Es importante que tome *todo* el medicamento para obtener el mejor resultado posible, y asegurese de tomar los líquidos para mantenerse hidratado

Serie de la primera dosificación: a las 3:00 pm

Una dosis (trague 4 tabletas con 8 oz de cualquier líquido transparente) cada 15 minutos hasta completar un total de 5 dosis (20 tabletas)

Serie de la segunda dosificación: a las 8:00 pm

Una dosis (trague 4 tabletas con 8 oz de cualquier liquido transparente cada 15 minutos para hasta completar un total de 3 dosis (12 tabletas)

3. Continúe tomando liquidos claros hasta que se acueste.
4. No tomar nada despues de la medianoche.

El dia del examen:

1. No tomar ni comer nada en la mañana del procedimiento, solo las medicinas aprobadas por su doctor.
2. Si tiene que tomar medicinas, puede tomarlas con un poquito de agua.
3. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento por favor llamar a la oficina al **305-692-6100** o **305-674-5925 opcion #2.**
4. No puede manejar, tomar bus o taxi sin acompañante despues del procedimiento. Tiene que star acompañado por un adulto. Si usted no cumple los requisitos, el hospital o el centro ambulatorio podria cancelar su cita.