

Los Pre-adolescentes entre los 11 y 12 Años de Edad Necesitan 3 Vacunas:

VPH, Tdap y Meningitis



¡Vacune a su hijo/a con las 3 vacunas hoy para protegerlo!



Estas vacunas para los pre-adolescentes ayudan al cuerpo contra enfermedades serias y mantienen a los niños seguros mientras crecen.



En muchos estados, los niños tienen que entregar sus registros actualizados de las vacunas a la escuela antes de empezar el séptimo grado. Así que no espere – ¡tenga a sus hijos al día con sus vacunas!



La vacuna contra el HPV se pone en 2 inyecciones. La segunda se pone entre 6 y 12 meses después de la primera. Los adolescentes de 15 años o mayores necesitan 3 inyecciones.

éPreguntas?



Vea más detalles y Mire videos en línea www.3porfavor.org



Escanee usando un lector de códigos QR ¿Qué Quieren Decir Todas Esas Letras,

La vacuna contra VPH

Protege a las niñas y niños contra el virus del papiloma humano (VPH) que causa 6 tipos de cáncer. Esta vacuna funciona mejor cuando se da entre los 11 y 12 años de edad. La vacuna contra el HPV se pone en 2 inyecciones. La segunda se pone entre 6 y 12 meses después de la primera. (o 3 invecciones si la empezó a partir de los 15 años)

La vacuna contra Tdap

Protege contra 3
enfermedades graves
llamadas tétanos,
difteria y tos ferina.
Los pre-adolescentes
deben vacunarse
a los 11 o 12 años
con esta vacuna. Se
requiere Tdap para
entrar el 7mo grado.

La vacuna contra Meningitis

Protege contra las bacterias que causan la meningitis, o inflamación de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal y la sepsis (una infección en la sangre). Los pre-adolescentes deben vacunarse entre los 11 y 12 años at ages 11 or 12.

