

## 常見的問題 繼續

### Q7. 配戴的效果是否為永久性質？

A7. 只要持續配戴角膜塑型鏡片，則矯正效果可維持。若停戴就會恢復至矯正前的度數。

### Q8. 老花眼患者是否適合配戴Ortho-K鏡片？

A8. 大部份有近視的人到了40歲，看近需要戴另一付眼鏡，這種現象叫老花眼。

Ortho-K 鏡片亦可提升有近視且有老花的患者看遠及看近視力。


## Ortho-K 鏡片保養方法

角膜塑型鏡片，是使用特殊硬式高透氧材質製造，不易有細菌滋生，但仍須遵守正確的硬式隱形眼鏡保養方法。

通常清洗鏡片時，手上的油脂、化妝品或是淚液中的蛋白質，若過度用力搓洗，就會殘留於鏡片上，甚至造成鏡片變形，為避免蛋白質沉澱以及鏡片變形，**請不要用力搓洗**，同時一定要使用專門針對 Ortho-K 鏡片調配的**專用保養藥水**來清潔鏡片，才能達到鏡片的最大效能以及延長鏡片的使用壽命。

## 角膜塑型術

白天不用戴眼鏡



度數不易再增加

## Ortho-K 在市場上有多久了？

Ortho-K 角膜塑型術，約於西元1960年在美國發明，之後經過許多學者專家以嚴謹的態度，共同努力研究，發展成目前最先進，最有效的角膜塑型夜戴型鏡片。

由於新一代的超高透氧鏡片材質和高科技的製作技術，Ortho-K 鏡片可依各種不同角膜形狀，量身訂做，裝配成功率非常高，且廣泛的被世界各國所接受。它的安全性及有效性，已通過嚴格的臨床評估，早就獲得美國FDA及台灣行政院衛生署核准許可上市。

Ortho-K 角膜塑型術，必須由美國原廠公司授權，受過訓練，有經驗的眼科專科醫師，執行驗配。

我不用戴眼鏡了！



美國 FDA 核准通過  
安全·有效  
台灣衛生署核准

美國  
原裝進口



# 近視一直增加怎麼辦？

## 角膜塑型術 Ortho-K

兒童近視通常在7歲時開始發生，之後每年平均約增加75度~100度。如果不加以適當的控制，變成高度近視，就很容易導致視網膜剝離、黃斑部病變、飛蚊症，也比一般人更容易得到青光眼、白內障..等嚴重症狀。


如果戴眼鏡，不但日常生活不方便、不雅觀、不舒服，鏡架也會滑落到鼻樑、壓迫鼻樑，運動撞擊時又會受傷。

點散瞳劑治療，不但有畏光和看近不清楚的困擾，**度數也一直再增加**。

根據醫學雜誌報導，及多年臨床觀察，大部份的學童配戴角膜塑型鏡片後，**白天就可用不用戴眼鏡**，長期配戴，**近視度數也不易再增加**，也可以不必再點散瞳劑。

**Ortho-K** 角膜塑型鏡片，大約可矯正近視600度，散光300度。

## Ortho-K 近視矯正原理



**Ortho-K** 角膜塑型鏡片，輕輕接觸角膜，配合上眼皮的眨眼動作及淚液的衝擊，慢慢的改變角膜形狀，使角膜形狀逐漸變平，以矯正近視及散光。這種變化是可逆的，只要停戴鏡片，角膜就會完全恢復至矯正前的形狀及度數。

一般角膜塑型的效果，依個人體質、角膜情況、近視度數及散光度數而定，大約需要1~3個月達到最大效果。每晚配戴8~9小時，白天就有清晰的視力。往後也要定期追蹤檢查及保養鏡片，建議每1~2個月回診一次。

**如眼睛有任何不舒服或紅腫、疼痛，請立即停戴，並速看眼科醫師。**

**Ortho-K** 角膜塑型鏡片使用高透氧材質，即使晚上睡眠時配戴，角膜仍可得到足夠的氧氣，確保眼睛的健康。

## Ortho-K 角膜塑型術常見的問題

**Q1. 角膜塑型鏡片矯正視力，會不會傷害眼球？**

**A1.** 遵照醫生指示及正確的配戴方法，並每1~2個月回診追蹤檢查，就可放心配戴。

**Q2. 配戴角膜塑型鏡片時，會有不適感嗎？**

**A2.** 配戴初期會有異物感，但因在睡覺時才配戴，所以很快就能適應。

**Q3. 長期配戴角膜塑型鏡片，會不會有併發症？**

**A3.** 只要配戴符合自己角膜形狀的塑型鏡片，遵守鏡片配戴規則且定期回診追蹤檢查，就能使併發症降至最低。

**Q4. 有乾眼症的人，可以配戴角膜塑型鏡片？**

**A4.** 若有乾眼症卻又不想戴眼鏡的人，經過醫師診斷，**Ortho-K** 角膜塑型術或許是最適當的選擇。

**Q5. 若近視超過600度以上，是否仍能配戴？**

**A5.** 近視較深的兒童，也可以配戴，若白天不夠清楚，可以配戴一付度數較輕的眼鏡，使日常生活更輕鬆。

**Q6. 怎樣的族群適合配戴 Ortho-K？**

- A6.**
1. 不喜歡配戴眼鏡者。
  2. 近視度數增加太快者。
  3. 兩眼嚴重視差者。
  4. 近視且有老花的患者。