

OBSTRUCCION INTESTINAL POSTOPERATORIA POR BRIDAS

Dr. Rodman López


www.centrodeltcancer.com

Diciembre de 2010



OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS

Paciente de 84 años en su 3er. Semana postoperatoria de Colectomía del Transverso por Cáncer, se presentó con dolor tipo cólico en abdomen superior izquierdo, vómitos biliosos y ausencia de evacuaciones y flatos en las últimas 24 horas. En esta RX de abdomen vemos distensión de asas de intestino delgado en abdomen sup izquierdo.



OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS


Esta RX de pie muestra varios niveles hidroaéreos en las asas de yeyuno dilatadas. Se trató con descompresión por sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica y se inició dieta líquida 72 horas después cuando ya había evacuaciones y flatos pero no toleró la dieta y las nuevas RXs demostraron los mismos hallazgos iniciales.




OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS

Se practicó Laparotomía Exploradora encontrando adherencias firmes que sujetaban y obstruían por angulación el intestino a nivel de los primeros 30 cms del yeyuno las cuales fueron seccionadas resolviendo la obstrucción intestinal.

La flecha señala el sitio de la obstrucción.



Vemos aquí la dilatación y edema de la pared del asa intestinal proximal(flecha verde)
El sitio de obstrucción y esfacelación de la serosa es señalado por la flecha amarilla
Nótese los puntos de sutura que refuerzan la pared intestinal (flecha azul).



OBSTRUCCION INTESTINAL POR BRIDAS

Asa proximal dilatada, con signos inflamatorios de la pared (flecha verde)

Area de obstrucción con esfacelación de la serosa (flecha amarilla)

Asa distal sana (flecha azul)

OBSTRUCCION INTESTINAL POSTOPERATORIA POR BRIDAS

Dr. Rodman López

www.centrodeltcancer.com

Tels. (503)2226-2427 y (503)7140-4427