


CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

Dr. Rodman López

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer


www.centrodeltcancer.com

DICIEMBRE DE 2010



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

Mujer de 44 años, nuligesta, premenopausica, con calcificaciones mamarias difusas bilaterales de larga evolución. Esta mamografía cefalocaudal muestra calcificaciones gruesas de aparición reciente en el cuadrante superior externo de la mama izquierda señaladas con la flecha. La gran calcificación adyacente es un fibroadenoma calcificado. **NO EXISTE TUMOR PALPABLE NI SINTOMAS.**



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

La proyección lateral oblicua muestra las calcificaciones de reciente aparición y sospechosas de malignidad señaladas por la flecha en la mama izquierda. La mamografía puede detectar cáncer hasta un año antes de que los tumores puedan palparse y debe realizarse anualmente a partir de los 35 años sobre todo cuando la mujer no ha tenido hijos o tuvo su primer hijo después de los 30 años y hay historia heredofamiliar de cáncer de mama y ovario.



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

Se hizo un marcaje preoperatorio del sitio sospechoso colocando una aguja con ayuda de mamografía y se extirpó tejido de aproximadamente 5 cms de diámetro encontrando en su parte central un Adenocarcinoma Canalicular Infiltrante Moderadamente Diferenciado de 1.5 cms de diámetro con márgenes quirúrgicos libres de tumor y sin invasión vascular ni linfática.



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

El tratamiento quirúrgico se completó haciendo Disección de los Niveles Axilares Ganglionares I y II : se obtuvo 16 ganglios en los cuales no se encontró metástasis. El estudio de los Marcadores Tumorales reveló presencia de Receptores Estrogénicos y Progestacionales y sobre expresión del gene Her2neu.



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

La resección del tumor primario se practicó mediante una incisión periareolar y la disección axilar mediante incisión en los pliegues axilares, evitando la Mastectomía.



CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

Este es el aspecto final del Tratamiento Quirúrgico Conservador.

Deberá recibir como tratamientos complementarios Radioterapia Externa a toda la glándula mamaria y la axila y tratamiento antiestrogénico por vía oral durante 5 años. En este caso no es necesario recibir Quimioterapia porque no existen factores de alto riesgo para recurrencia tumoral.

CANCER DE MAMA EN ETAPA INICIAL

Dr. Rodman López

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

TELS. (503)2226-2427 Y (503)7140-4427