

QUISTES MAMARIOS

Dr. Rodman López

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

Junio de 2011



QUISTES MAMARIOS


Los Quistes Mamarios son una **Enfermedad Benigna No Proliferativa** de las mamas, producto de la acumulación de líquido en los conductos terminales de los lóbulos de la glándula, mas frecuente entre las edades de 35 a 55 años, se manifiestan por tumores blandos o turgentes según la tensión de su contenido, de bordes lisos y regulares, no móviles, cuyo diagnóstico es clínico y su confirmación puede hacerse por ultrasonografía encontrando una imagen anecoica, con cápsula lisa, sin detritus, tabiques ni imágenes sólidas en su interior.



QUISTES MAMARIOS


La fisiopatología de los quistes mamarios no está bien comprendida, pero se acepta que son producto de un imbalance hormonal con predominio estrogénico o por hipersensibilidad del tejido glandular a los estrógenos. Cuando ha sido súbita la acumulación de líquido en su interior son dolorosos.

Una forma más barata y efectiva de confirmar el diagnóstico y de tratarlos es la punción con aguja fina, obteniendo líquido claro, amarillo cetrino, pajizo o verdoso.



QUISTES MAMARIOS


La mamografía no es un método idóneo para el diagnóstico de Quistes porque con la mamografía no es posible diferenciar si una lesión es sólida o quística. Esta imagen mamográfica cefalocaudal muestra el quiste de nuestra paciente en los cuadrantes internos de la mama izquierda (flechas amarillas), la cual podría ser también la imagen de un Fibroadenoma, que es un tumor benigno pero sólido.



QUISTES MAMARIOS

Esta es la proyección mamográfica oblicua lateral que además del quiste muestra calcificaciones en el trayecto de las arterias de las mamas de esta ama de casa de 60 años (flechas rojas).

La punción y drenaje del quiste es un tratamiento físico y psicológico eficaz para la paciente, pero la recurrencia es muy frecuente y por lo general es conveniente administrar un tratamiento antiestrogénico por varios meses.



QUISTES MAMARIOS

Por definición un quiste no está relacionado con cáncer pero puede coexistir con él, aunque en muy raras ocasiones. Debido a eso, cuando el líquido del quiste es hemorrágico o cuando por ultrasonografía se encuentra en el interior del quiste una imagen sólida o septos o muchos detritus, es necesario enviar muestra para estudio citológico del líquido drenado, tal como lo demuestra ésta fotografía.

QUISTES MAMARIOS

Dr. Rodman López Arias

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

Junio de 2011