

ሌፓታይትስ ኤ ቫይረስ

Hepatitis A Virus

ይህ ቫይረስ ጉብትን በቀጥታ ከሚያጠቁ ቁጥራቸው በርከት ካሉ ቫይረሶች አንዱ ነው። በዚህ ቫይረስ መለከፍ ጊዜያዊ የጉብት ቁስል በማስከትል በቀላሉ የሚያገግም ቀለል ያለ የበሽታ ስሜት ያስከትላል። በመሆኑም ምንም አይነት ለየት ያለ ሕክምና አይስፈልገውም። በሀገር ቤት ይህ በሽታ የወፍ በሽታ ተብሎ ይታወቃል። አንዳንድ ጊዜ ባልተለመደ ሁኔታ በሽታው ከቦድ ያለ የህመም ስሜት በመፍጠር የጉብት መድከም በማስከትል ለሕይወት ማለፍ የሚያበቃ ደረጃ ይደርሳል። በዚህ በሽታ ተለክፈው ያገገሙ ሰዎች በደም ምርመራ ወቅት ለቫይረሱ ተጋልጠው የነበሩ መሆናቸውን የሚጠቁም ምልክት ያሳያል።

መተላለፊያ መንገዶች

ቫይረሱ በበሽታው ከተለከፉ ሰዎች አይነምድር ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ዋነኛ መተላለፊያው መንገድ ከሰው ወደ ሰው በቫይረሱ የተነካካ ምግብና መጠጥ አማካኝነት ነው። ስለዚህ ይህ በሽታ ምጣኔ ሀብታቸው ባልበለፀጉ ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ ይገኛል ምክንያቱም በቂ የሆነ የመፀዳጃ አገልግሎት ባለመኖሩ በበሽታው የተለከፉ ሰዎች ዐይነምድር አማካኝነት ቫይረሱ የመጠጥ ውሃና ምግብ ወይም ለመጠጥና ለምግብ አገልግሎት የሚሆኑ ቁሳቁሶች በመነካካት ከሰው ወደ ሰው ለመተላለፍ ስለሚያስችለው ነው።

የበሽታው ምልክትና ስሜቶች

- ድካም ስሜት
- ትኩሳት
- ማቅለሽለሽ ማስታወክ እና ማስቀመጥ
- ጠቆር ያለ የኮካኮላ መልክ ያለው ሽንት መሸናገት
- የጉብት ሕመም ስሜት (ሆድ ላይ በቀኝ በኩል ከጎን አጥንት ሥር ባለው አካባቢ)
- ዐይን ላይ ቢጫ ምልክት መታየት የመሳሰሉት ናቸው።

ምርመራ

ሐኪምዎ የሰውነት ምርመራና ቃለ ጥያቄ ተጨማሪ ሌፓታይትስ ኤ እና የጉብትን ሁኔታ ለማወቅ የሚያስችል የደም ምርመራ ሊያዘጋጅዎት ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለሌሎች የጉብት ቫይረሶች ሌፓታይትስ ቢ እና ሌፓታይትስ ሲ Hepatitis B and Hepatitis C የደም ምርመራ ያዘጋጃል። በሕመም ምልክት ደረጃ ሶስቱም ቫይረሶች ተመሳሳይ ስሜት ሊይሳዩ ይችላሉ። ስለ ሌፓታይትስ ሲ እና ቢ በሌላ ክፍል እናቀርባለን።

መከላከያ

- ከትባት ለህፃናት ከአንድ አመት ዕድሜ በመጀመር ሁለት ክትባቶች በስድስት ወር ልዩነት ይሰጣል
- ለማንኛውም በሽታው በከፍተኛ ደረጃ በሚገኝባቸው ሀገሮች መኖር ወይም ለጉብት ለሚሄዱ ሀገራት ዕል ለሚጠቀሙ ሰዎች
- የተመሳሳይ ስታ የግብረ ስጋ ግኑኝነት ለሚፈፀሙ ሰዎች

ክትባቱ በሽታውን ለመከላከል ቢያንስ የሁለት ሳምንት ጊዜ ይወስድበታል። ስለዚህ መንገድ ከመጀመርዎ ከሁለት ሳምንት በፊት ክትባቱን መጀመር ያስፈልጋል።

ይህ በሽታ ዘላቂ የመሆን ወይም ስር የመስደድ ባህሪ የለውም።

በድንገት ለበሽታው የተጋለጡ ከመሰለዎት ወደ ሆስፒታል ጊዜ ሳይሰጡ በመሄድ ቫይረሱ ላይ የሚያተኩር ለየት ያለ መድሃኒት ማግኘት በሽታው አንዳይከሰት ይረዳዎታል።