

MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Dr. Rodman López

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

Tels.(503)2226-2427 y (503)7140-4427

FEBRERO DE 2011



MELANOMA DE LA CABEZA Y EL CUELLO

Los Melanocitos, células que dan origen al Melanoma se localizan en las profundidades de la Epidermis junto a la lámina basal y proviene de las células totipotenciales de la cresta neural que en el período de organogénesis migran a todas partes del cuerpo. El Melanoma es uno de los Cánceres más agresivos que existen; el 90% se originan en la piel y el resto en las mucosas y órganos internos. Su agresividad es directamente proporcional a la profundidad de infiltración medida en milímetros. Existen Melanomas Amelánicos (No producen melanina).



MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Este Profesor de 81 años y de piel blanca tiene un Melanoma que se inició como una pequeña mancha la cual en un año se extendió superficialmente en un área de 15 X 15 cms. Infiltrando según la biopsia incisional hasta la dermis reticular con una profundidad de 1.75 mms. No se palpó ganglios sospechosos de metástasis en el Cuello y no está ulcerado. Noten las múltiples satelitis (flechas amarillas). Se clasificó como un Nivel III de Clark, Grado intermedio de Breslow, Estadío Clínico IB. El manejo inicial de éstos casos es la Excisión Quirúrgica.



MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Se pacticó la Excisión Quirúrgica Amplia incluyendo todas las satelitosis con Márgenes de Resección Negativos para Malignidad según Estudio Histopatológico Transoperatorio.



MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Se reconstruyó levantando dos colgajos de piel cabelluda que se deslizaron hacia el sitio del defecto: Un colgajo anterior con base Frontal y un colgajo posterior con base Occipital.



MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Se reconstruyó el defecto parietal con un injerto libre de piel. El estudio histopatológico de la pieza operatoria reveló un Melanoma de Extensión Superficial que infiltraba hasta la dermis reticular profunda, se clasificó como Nivel IV de Clark, Grosor Intermedio de Breslow de 2.5 mm, con Conteo Mitótico Bajo, de 5 mitosis en 10 campos de alto poder, con Infiltración Vascular y Linfática y con Satelitosis macro y microscópica. Límites de Resección Quirúrgicos Sanos.



MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Aspecto de la Reconstrucción el tercer día post-operatorio. En este caso aún cuando no haya metástasis linfáticas, el grosor no sea mayor de 4 mm, ni exista ulceración; debido a la presencia de infiltración linfática y vascular y la tendencia a diseminarse localmente por satélites deberá recibir Interferón alfa 2b o Interferón pegilado durante 52 semanas para mejorar la supervivencia libre de enfermedad. Si se detectara metástasis ganglionares cervicales deberá hacerse Disección Radical de Cuello.

MELANOMA DE CABEZA Y CUELLO

Dr. Rodman López

Cirugía y Quimioterapia del Cáncer

www.centrodeltcancer.com

Tels. (503)2226-2427 y (503)7140-4427