

www.kbgfoundation.com
info@kbgfoundation.com



La Fundación KBG está dedicada a brindar apoyo, asistir en programas de investigación y crear conciencia acerca del síndrome.

Para mantenerse actualizado y unirse a la comunidad privada, síganos en Facebook y Twitter.

@KBGFdn #kbgfdn #everylinkmatters



**INTERNATIONAL
KBG
SYNDROME
AWARENESS
DAY JUNE 11TH**

every link matters

**Comportamiento
en el
Síndrome KBG**

¿Qué trastornos del comportamiento están asociados al Síndrome KBG?

La gran mayoría de pacientes con el síndrome KBG reportan problemas de retraso cognitivo y/o conductual. Debido a que el Síndrome KBG es un "trastorno del espectro", los efectos van desde casi imperceptibles a severos.

Los adultos con KBG reportaron que las terapias correctivas y reafirmantes introducidas de manera temprana produjeron resultados más efectivos.

Se ha observado regresión en casi el 50% de la población..

INCIDENCIA EN EL SÍNDROME DE KBG

Los informes de pacientes con síndrome KBG muestran que más del 90% de los pacientes tienen problemas de comportamiento con o sin compromiso de la memoria.

PRONÓSTICO

La intervención temprana es crucial para mejorar los resultados. Cuando el síndrome KBG está presente, el inicio del tratamiento debe ser lo más pronto posible.

TRATAMIENTO

Como un trastorno del espectro actualmente no hay una terapia integral. Las terapias de conducta correctiva, así como también ciertos medicamentos se han utilizado con éxito.



Qué buscar:

Los síntomas más comunes en pacientes con KBG que reportan problemas de comportamiento incluyen:

SE DISTRAEN FÁCILMENTE

La capacidad de atención limitada y la necesidad de información sensorial adicional crean problemas de enfoque en los pacientes con KBG.



COMPORTAMIENTOS REPETITIVOS

Los pacientes KBG hacen preguntas repetitivas sin ser capaces de reconocer las respuestas. A menudo requieren múltiples respuestas antes de comprender.

RABIETAS

De acuerdo con informes de los pacientes, las rabietas debido a la frustración y la falta de comprensión son comunes.



RETRASO EN SUS COMPORTAMIENTOS (HÁBITOS)

Los pacientes tienden a tomarse más tiempo del esperado para realizar tareas diarias (como vestirse y cepillarse los dientes). No se conoce aún la raíz de esta causa.



ARREBATOS EMOCIONALES

Los arrebatos son extremadamente comunes y pueden durar horas. Estas reacciones tienden a estar conectadas con el miedo y la incapacidad para comunicarse / comprender las necesidades.



FALTA DE COMPREENSIÓN DE LAS CONSECUENCIAS.

Rara vez los niños KBG comprenden las consecuencias de sus acciones. Incluso en la edad adulta encontramos cierta confusión acerca de cómo reaccionar frente a ciertas acciones.

Terapias para probar:

Desafortunadamente, no existe una terapia estándar o tratamiento específico para los problemas de comportamiento que se observan en el síndrome KBG. Encuestamos al grupo familiar sobre los tratamientos que les han resultado más exitosos y los enumeramos aquí como referencia. Como siempre, consulte sus opciones con su médico.

MEDICAMENTOS

Si bien más del 50% de los pacientes con KBG han optado por no medicarse para el comportamiento, hay muchos que lo hacen con éxito. La encuesta más reciente enumera los principales medicamentos por orden de uso:

Melatonina	Adderall
Ritalin	Prozac/Zoloft
Concerta (Metilfenidato)	

TERAPIAS DEL COMPORTAMIENTO

Los pacientes con KBG que no usan medicamentos, a menudo confían en el Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) con éxito.

Las terapias para padres también muestran una buena respuesta con Triple P (Programa de Padres Positivos) en segundo lugar al ABA.

Las técnicas de comportamiento cognitivo también se han utilizado con un resultado positivo.

Las dietas sin gluten y sin caseína también han mostrado una respuesta positiva.

La clave para la mayoría de las terapias dirigidas al KBG es comenzar tan pronto como aparezcan los rasgos y mantenerse lo más consistente y paciente posible. No se demore en buscar ayuda, cuanto antes se establezcan las terapias, mejor será el resultado.

