

Decubitus Risicoscorelijst

Cliënt naam :

Geboorte datum:

Reden aanvraag zorg:

Overzicht zorg inzet :

Aantal punten	0 punten	1 punt	2 punten	3 punten
Mentale toestand	Goed	Lusteloos, gedepimeerd, gedecideerd, angstig	Zwaar depressief, psychotisch, verward volledig apatisch	Stuporeus, comateus
Neurologie	Geen afwijkingen	Geringe stoornissen, krachtsvermindering	Sensibelestoornissen, licht hemiparese (x2)	Hemiparese (x 2) Dwarsleasie: Onder Th 6: x 3 Boven Th 6: x 4)
Mobiliteit	Goed	Licht beperkt, loopt met hulp hele dag of regelmatig op. Rolstoel patiënt met goede armfunctie	Voornamelijk bedlegerig alleen uit bed bij verschonen. Hele dag passief in de stoel	Geheel bedlegerig
Voedingstoestand	Goed	Matig; als na enkele dagen niet gegeten	Slecht; langer dan week niet gegeten. Bij braken en diarree	Uitgeteerd; eetlust is sinds lange tijd zeer slecht of afwezig. Er bestaat een ernstig gewichtsverlies
Voeding	Eet zelf, of krijgt sondevoeding, eetlust goed	Parenterale voeding	Krijgt sondevoeding, maar heeft geen eetlust	Geen voeding
Incontinentie	geen	Af en toe voor urine	Voor urine en/of faeces bij urinekatheter of uritip	Geheel incontinent
Leeftijd	Jonger dan 50	50 – 60 jaar	60 –70 jaar	Ouder dan 70
Lichaamstemperatuur	Lager dan 37.5°	37.5° - 38.5°	38.5° - 39.0°	Hoger dan 39.0° Lager dan 35.5°
Medicatie	geen	Corticosteroiden, slaapmiddelen, anticoagulantie (niet heparine)	Pijnstillers, tranquilizers, cytostatica, orale antibiotica	Parenterale antibiotica
Diabetes	geen	Alleen dieet	Dieet en orale medicatie	insuline

Datum							
Mentale toestand							
Neurologie							
Mobiliteit							
Voedingstoestand							
Voeding							
Incontinentie							
Leeftijd							
Lichaamstemperatuur							
Medicatie							
Diabetes							
Totaal							

Niet verhoogd risico < 8, verhoogd risico 8 –12, extra verhoogd risico > 12.

Bij een score van 8 of hoger zie stroomdiagram zit- & ligondersteuning antidecubitus!